

FEUILLE D'EXERCICES # 1

Exercice 1 *Opérations ensemblistes*

Soient A , B et C trois événements. Écrire les événements suivants, en utilisant les opérations ensemblistes d'intersection, de réunion, de différence symétrique et de passage au complémentaire. Illustrer chaque résultat par un diagramme en patates.

1. Aucun des événements A , B et C ne se réalise.
2. Au moins un des événements A ou B se réalise.
3. Exactement un des événements A ou B se réalise.
4. Au moins deux des événements A , B , C se réalisent.
5. Exactement un des événements A , B , C ne se réalise pas.

Exercice 2 *Opérations ensemblistes et probabilités élémentaires*

Un bureau possède deux lignes téléphoniques. La première a un taux d'occupation de 0,7 ; la seconde de 0,5. Les deux lignes sont simultanément occupées avec une probabilité 0,3. Modéliser cette expérience aléatoire puis déterminer la probabilité pour qu'une ligne au moins soit occupée ; la probabilité pour qu'une ligne au moins soit libre ; la probabilité pour qu'une seule ligne soit libre.

Exercice 3 *Manipulation de fonction indicatrices*

Soient A , B , C des parties d'un ensemble Ω . On rappelle que $\mathbb{1}_A$ est la fonction indicatrice telle que $\mathbb{1}_A(x)$ vaut 1 si $x \in \Omega$ est dans A et 0 sinon.

1. Écrire $\mathbb{1}_{A \cap B}$ en fonction de $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_B$.
2. Écrire $\mathbb{1}_{A \cup B}$ en fonction de $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{A \cap B}$.
3. Écrire $\mathbb{1}_{A \setminus B}$ en fonction de $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_B$.
4. Si $(A_n)_{n \geq 1}$ et $(B_n)_{n \geq 1}$ sont des suites croissante et décroissante respectivement, montrer que

$$\mathbb{1}_{\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \uparrow \mathbb{1}_{A_n}, \quad \mathbb{1}_{\bigcap_{n=1}^{+\infty} B_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \downarrow \mathbb{1}_{B_n}.$$

Exercice 4 *Vrai ou faux ?*

Les énoncés suivants sont-ils vrais pour tous événements A et B et tous les espaces de probabilité ?

1. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$
2. $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B^c) - \mathbb{P}(A^c \cap B)$
3. $\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
4. $\mathbb{P}((A \cup B)^c) = 1 - \mathbb{P}(A^c \cap B^c)$
5. $\mathbb{P}(A) < \mathbb{P}(A \cup B) ? \quad \mathbb{P}(A) > \mathbb{P}(A \cap B) ?$
6. $A \cap (A \cup B)^c = \emptyset$
7. $A \Delta B = A^c \Delta B^c$ (on rappelle que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$)

Exercice 5 *Lancer de dés*

On lance deux dés équilibrés. Après avoir modélisé cette expérience, déterminer la probabilité des événements suivants.

1. Les deux dés donnent le même résultat.
2. Le résultat d'au moins un dé est strictement supérieur à 4.
3. La somme des résultats est strictement supérieure à 8.
4. À supposer que l'on ne s'intéresse qu'à la somme des résultats obtenus, proposer un nouveau modèle probabiliste de cette expérience.

Exercice 6 *Six et double six*

1. Est-il plus probable d'obtenir au moins une fois six en lançant quatre dés usuels, ou bien d'obtenir au moins une fois un double six en lançant vingt-quatre fois deux dés usuels ?
2. On lance n fois de suite deux dés normaux. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un double six ? Pour quelles valeurs de n cette probabilité dépasse-t-elle $1/2$?

Exercice 7 *Dé truqué*

On lance un dé truqué à 6 faces, numérotées de 1 à 6 et l'on suppose que la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro qu'elle porte.

1. Calculer la probabilité de tomber sur chacune des 6 faces.
2. Quelle est la probabilité de tomber sur un chiffre pair ?

Exercice 8 ★ *Formule du crible*

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilités et $(A_k)_{1 \leq k \leq n}$ une famille d'événements. On rappelle que $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$. Montrer que l'on a la relation

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) - \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) + \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

Plus généralement, montrer que l'on a la formule suivante, appelée formule du crible

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{\#I-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k \in I} A_k\right).$$