## Contrôle continu # 1

Durée : 1h30, aucun document autorisé.

## Exercice 1 ) Brownien ou pas brownien

- 1. Soit Z une variable aléatoire de loi normale centrée réduite. Pour  $t \geq 0$ , on pose  $X_t := \sqrt{t}Z$ . Le processus  $(X_t)_{t\geq 0}$  est-il un mouvement brownien?
- 2. Soient X et Y deux mouvements browniens réels indépendants et soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Pour  $t \geq 0$ , on pose  $Z_t := \cos(\theta) X_t + \sin(\theta) Y_t$ . Le processus  $(Z_t)_{t \geq 0}$  est-il un mouvement brownien?

## Exercice 2 Primitive du mouvement brownien

Soit  $(B_t)_{t\geq 0}$  un mouvement brownien réel défini sur un espace de probabilités  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . On considère le processus  $(X_t)_{t\geq 0}$  défini pour  $t\geq 0$  et  $\omega\in\Omega$  par

$$X_t(\omega) := \int_0^t B_s(\omega) ds,$$

où la dernière intégrale est une intégrale au sens de Riemann (la fonction  $s \mapsto B_s(\omega)$  est continue).

- 1. Montrer que le processus  $(X_t)_{t\geq 0}$  est un processus gaussien.
- 2. Expliciter sa moyenne et sa fonction de covariance.

## Exercice 3 Martingales, théorème d'arrêt et temps d'atteinte

Soient  $(B_t)_{t\geq 0}$  un mouvement brownien réel et  $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$  sa filtration naturelle. On rappelle que le processus  $(X_t)_{t\geq 0}$  défini par  $X_t := B_t^2 - t$  est une martingale par rapport à  $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ . Pour a < 0 < b, on introduit les temps d'atteinte

$$T_a := \inf\{t \ge 0, B_t < a\}, \quad T_b := \inf\{t \ge 0, B_t > b\}, \quad T_{ab} := \inf\{t \ge 0, B_t \notin [a, b]\},$$

dont on rappelle qu'ils sont finis presque sûrement.

1. Montrer que  $\mathbb{E}[B_{T_{ab}}] = 0$  et en déduire que

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{b}{b-a}, \quad \mathbb{P}(T_b < T_a) = \frac{-a}{b-a}.$$

- 2. Montrer que  $\mathbb{E}[T_{ab}] = |ab|$ .
- 3. Pour  $\lambda \in \mathbb{R}^+$  et  $t \geq 0$ , on pose  $M_t^{\lambda} := e^{\lambda B_t \lambda^2 t/2}$ . Montrer que le processus  $(M_t^{\lambda})_{t \geq 0}$  est une martingale par rapport à  $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ .
- 4. En déduire l'expression explicite de la transformée de Laplace  $\mathbb{E}[e^{-uT_b}]$ , pour  $u \geq 0$ .